# Verifine

# ИГЛЫ ДЛЯ ИНСУЛИНОВЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК

## наименование медицинского изделия

Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек, в вариантах исполнения: 0,33(29G)х12мм, 0,30(30G)х8мм, 0,25(31G)х8мм, 0,25(31G)х6мм, 0,25(31G)х5мм, 0,25(31G)х4мм, 0,23(32G)х8мм, 0,23(32G)х6мм, 0,23(32G)х6w, 0,23(32G)х6w, 0,23(32G)x6w, 0,23(32G)x6w, 0,23(32G)x6w, 0,23(32G)x6w, 0,23(32G)x6w, 0,23(32G)x6w, 0,23(

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Иглы Verifine для инсулиновых шприц-ручек (далее иглы Verifine) предназначены для подкожного введения инсулина при лечении диабета в условиях клиник, больниц, в полевых условиях, а также для использования пациентами в домашних условиях.

**Внимание:** рекомендацию по выбору размера иглы, места укола и технике введения нужно получить у лечащего врача.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- При использовании медицинского соблюдайте правила антисептики: руки и место укола необходимо обработать антисептиком.
- Не используйте иглу без упаковки или в поврежденной упаковке.
- Регулярно меняйте место инъекции.
- После вскрытия упаковки немедленно используйте иглу, затем утилизируйте ее.
- Выбрасывайте использованные иглы только с надетым на них внешним защитным колланком
- Не используйте иглу с истекшим сроком годности.
- Не храните шприц-ручку с установленной иглой.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Использовать при температуре от 0 до +50 С°.
- Хранить от 0 до +50 С° и отн. влажности воздуха не выше 80% в сухом проветриваемом помещении, в месте защищенном от прямых солнечных лучей.
- Транспортировка от -20 до +50 С°.
- После транспортировки в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 24 часов.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Оторвите защитный ярлык иглы.



Совместите шприц-ручку с внутренней резьбовой частью основания иглы, навернув иглу по часовой стрелке.



Снимите верхний колпачек иглы (сохраните его).

Снимите и выбросьте внутренний колпачок иглы.





Удалите воздух из резервуара шприц-ручки и иглы. Установите дозировку для инъекции. Обработайте место инъекции спиртовой салфеткой. Введите иглу под кожу. Большим пальцем нажмите на ручку установки дозы. Оставьте иглу на месте на 5-10 секунд для предотвращения вытекания инсулина из места введения. Вытащите иглу из кожи.



Завершите инъекцию, надев на иглу внешний колпачок.



Удалите иглу со шприц-ручки, повернув ее против часовой стрелки.

**Внимание:** чтобы избежать случайных уколов, никогда не надевайте внутренний колпачок обратно на иглу.

Универсальная винтовая резьба (согласно стандарта ISO11608-2:2012) обеспечивает совместимость игл Verifine с одноразовыми и многоразовыми шприц-ручками типа А, в том числе следующих производителей: ХумаПенЛюксура ДТ, ХумаПен® Саввио, ХумаПен® ЭргоII, Хумалог® КвикПен, НовоРапид® ФлексПен®, НовоПен® 4, Левемир® ФлексПен®, Тресиба® ФлексТач®, НовоПен Эхо®", Виктоза®, КликСТАР, СолоСтар®, AutopenClassic, Autopen 24, Биосулин® Пен и других.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Иглы Verifine 100 шт.;
- Фирменная упаковочная коробка 1 шт.;
- Инструкция по применению 1 шт.

В комплект не входит:

• Шприц-ручка;

• Спиртовая салфетка.

#### **СТЕРИЛИЗАЦИЯ**

Иглы Verifine простерилизованы в окиси этилена. Изделия в первичной ненарушенной упаковке являются стерильными, нетоксичными и апирогенными в течение 5 лет.

#### СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с момента производства. Иглы Verifine должны использоваться в течение срока годности, иглы с истекшим сроком годности применению не подлежат.

#### СИМВОЛЫ И НАДПИСИ

444	Наименование и адрес изготовителя	P-	Знак соответствия Ростест
REF	Каталожный номер	LANEX	Не содержит латекс
LOT	Номер партии	[]i	См. инструкцию
$\square$	Срок годности	0	Знак «Зеленая точка»
8	Не использовать повторно	Σ,100	Содержит достаточное для 100 инъекций количество
STERILE EO	Стерилизовано в окиси этилена	<b>( 6</b> 0197	Маркировка СЕ

Производитель:

Промайзмед Ханчжоу Медитек Ко., Лтд

провинция Чжэцзян, г. Ханчжоу, р-н Юйхан, Цанцяньстрит, Лунтань Роуд, № 12 Тел.: +86 571 8877 2986; e-mail: admin@promisemed.ca; www.promisemed.ca

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «АВАНТМЕД»

119618, Россия, Москва, ул. 50 лет Октября, дом 4, офис 104 тел.:+7 (495) 220-17-19; e-mail:info@avantmed.ru; www.avantmed.ru.